

Herbst

SAATGUT-BOX S



DE-ÖKO-007



Endivie (Frisée) Wallonne

Sehr schöne Sorte wegen seiner feinen, eingeschnittenen und stark gekräuselte Blätter.

Sehr feiner Geschmack. Sehr gut für rohen Verzehr, Dekoration und leicht angegünstet.

Aussaart: Ende April bis Mitte Juli für den Freilandanbau, Pflanzung Ende Mai bis Anfang Juli, Ernte Anfang Juni bis Anfang November.

Für den Gewächshausanbau Ende Februar bis Anfang April, Pflanzung April bis Juli, Ernte Juli bis September. Vollsonniger Standort!



Feldsalat Vit

Vitaler Feldsalattyp mit geadertem, breitem, dunkelgrünem und ovalem Blatt. Der Ertrag ist höher als bei vergleichbaren Sorten.

Deshalb ist Vit neben dem Anbau im Freiland auch für den ganzjährigen Anbau Gewächshaus oder in Folienhäusern bestens geeignet.

Vit ist raschwüchsig und frosthart, sowie widerstandsfähig gegen Falschen Meß **Aussaart:** Anfang Juli bis Ende September, bzw. ganzjährig im geschützten Anbau breitwürfig (flächig) oder in Reihen mit 10-15 cm Abstand.

Saatbeet während der Keimung feucht halten.

Ernte von September bis April bzw. auch ganzjährig.

Tipp: Feldsalat geht bei über 25 Grad Bodentemperatur in Keimruhe, d.h. er keimt nicht bzw. nicht gleichmäßig (evtl. schattieren).



Kresse Cresso

Einfache Kresse, keimt sehr schnell und einheitlich. Auch für Freilandanbau geeignet **Aussaart:** Kann jederzeit vorgenommen werden, im Herbst und Winter breitwürfig in Schalen oder Töpfe.

Bei Zimmertemperatur kultivieren.

Im zeitigen Frühjahr breitwürfig ins Frühbeet.

Im Frühjahr und Sommer in Reihen direkt ins Freiland, Reihenabstände etwa 15 cm. Gibt 2-3 Wochen nach der Aussaat erfrischenden Schmeckt auch auf dem Butterbrot sehr lecker (mit etwas Zitronensaft, Kräutern und Pfeffer abgeschmeckt).



Rettich Runder Schwarzer Winter

Tiefschwarzer, sehr festfleischiger, runder Winterrettich.

Aussaaten von Juni bis mitte August direkt ins Freiland.

Saatabstand ca. 20 x 25 cm.

Herbst

SAATGUT-BOX S



DE-ÖKO-007



Spinat Frühes Riesenblatt

Schnellwachsende, frühe Sorte die sehr von nährstoffreichem Boden profitiert.

Aussaart: Ab März bis September breitwürfig oder in Reihen. Reihenabstand 20-25 cm, auf ca. 50 cm vereinzeln.

Tipp : Bei Sommersaaten(Juni/Juli) zügig ernten wegen Schoßgefahr. **Salatrauke/Rucola**

Raschwüchsig, ganzjähriger Anbau möglich. Ca. 25-30 cm hoch. Angenehm erdnussartiger Geschmack.

Junge Blätter zur Salatbereitung, als Gewürzkraut oder als Pizzabelag (erst nach dem Backen auflegen, wird sonst zu Heu).

Sehr vitaminreich.

Samen auch zur Senfherstellung geeignet.

Aussaart: ab März bis September direkt ins Freiland, im Gewächshaus entsprechend früher und länger.

Reihenabstände etwa 15 - 20 cm oder breitwürfig.

Nicht zu dicht säen.

Keimtemperatur 15 - 20 °C.

Roter Butterhäuptl

Ein kleiner roter Kopfsalat mit einem Kopfgewicht von etwa 200 Gramm. Bringt schon sehr früh Farbe auf den Teller,

kann recht eng (25x25 cm und enger) gepflanzt werden.

Tipp: Auf halben Endabstand pflanzen und nach und nach jeden

zweiten Salat als Schnittsalat ernten. Wenn man von Wintersalaten spricht, dann meint man meist Zuckerhut, Endivien oder Feldsalat.

Hier haben wir aber etwas anderes für Sie: im Herbst gepflanzte Kopfsalate, mit außer-gewöhnlich gutem Geschmack,

die im nächsten Frühjahr dann frühzeitig zu ernten sind.

Kopfsalate sind in jungem Zustand viel robuster, als man ihnen gemeinhin zutrauen würde. Die Salate sind nur für den frühen Freilandanbau und den Überwinterungs-anbau geeignet.

Beim Überwinterungsanbau:

Direktsaat Ende August oder Pflanzung Mitte Oktober.

Die Oberkante der Töpfchen sollte mit dem Boden abschließen.

Die Salate sollen mit etwa 8 echten Blättern überwintern.

Schnee ist der beste Winterschutz.

Nur Kahlfröste sind gefährlich. Ggf. mit dünnem Vlies oder Stroh schützen (so spät wie möglich – nach Weihnachten).

Salat Humil

Ein im besten Sinne altmodischer echter Buttersalat.

Er bildet mittelgroße hellgrüne Köpfe mit geringem Umblattanteil.

Die Köpfe haben ein blondes Herz, die Blätter sind zart,

fest geschichtet und haben einen sehr starken Buttercharakter

dem der moderne Salate gewöhnte Konsument häufig zunächst fassungslos gegenübersteht. Humil ist nur für den frühen Freilandanbau und den Überwinterungsanbau geeignet.

Beim Überwinterungsanbau: Direktsaat Ende August oder Pflanzung Mitte Oktober.

Die Oberkante der Töpfchen sollte mit dem Boden

abschließen. Die Salate sollen mit etwa 8 echten Blättern überwintern.

Im Februar/März in Schalen auf der Fensterbank aussäen oder als Direktsaat im Juli/August beim frühen Freilandanbau. Saat nur leicht mit Erde bedecken

